

# Recomendaciones para el Manejo del Becerro Recién Nacido

## Corrales de maternidad

- En lo posible, colocar un animal al parir por corral.
- No usar para vacas enfermas, incluyendo vacas con enfermedad de Johne's.
- Mantener con cama seca y limpia. Para evaluar la cama, arrodillarse sobre la misma y si al pararse las rodillas están mojadas o sucias, colocar más material de cama.
- El corral debe limpiarse y desinfectarse después de cada parto.

## Nacimiento

- Trasladar a la vaca al corral de maternidad cuando empieza el parto.
- Asistir a la vaca en el parto si es necesario.
- Usar guantes de látex cuando se asista al becerro recién nacido. Cambiar guantes cuando sea necesario.
- Separar al becerro de la madre inmediatamente después del parto.
- Secar al becerro con toallas limpias (ej. toallas de baño).
- Sumergir el ombligo del becerro en solución de yodo al 7%.
- Administrar al becerro las vacunas indicadas por el veterinario del rancho.
- Ofrecer agua fresca a la vaca recién parida.

## Primeros minutos después del parto

- Ordeñar a la vaca lo más rápido posible después del parto, preferentemente antes de una hora de parida. Retrasar el ordeño va a resultar en calostro de menor calidad.
- Usar técnicas de preparación de ubre apropiadas.
- Comprobar que el equipo de ordeño esté limpio y seco.
- No usar calostro de vacas positivas a la enfermedad de Johne's, BVD, BLV, Salmonella sp., o vacas con mastitis por Mycoplasma bovis y Staph. Aureus.
- Usar Secure<sup>®</sup>, reemplazante de calostro, si la cantidad y/o calidad del calostro no son adecuadas.

## Primer hora después del parto

- Alimentar al becerro con 4 cuartos de calostro (1 galón) de buena calidad entre la primera y la cuarta hora de vida.
- Cuando se use Secure, mezclar un paquete con 2 cuartos de agua a 110° F en un balde limpio dedicado solamente para este propósito. Suministrar los 2 cuartos en la primera hora de nacido el becerro.
- Alimentar al becerro con biberón, o con sonda esofágica cuando sea necesario.
- Trasladar al becerro a su cobertizo o corral después de suministrar calostro. Los corrales o cobertizos deben estar limpios, con buena cantidad de cama y al reparo de corrientes de aire.

Vita Plus - Productos para becerros  
Alimentando el hato del mañana

August 2008



An Employee-Owned Company

[www.vitaplus.com](http://www.vitaplus.com) - 1.800.362.8334